

# Nacontrole

Na de ingreep voor ontslag komt de behandelend arts nog even langs bij je kind op de ontwaakzaal of op de kamer en controleert hij/zij of alles in orde is.

We raden aan om 1 week na de ingreep een afspraak vast te leggen bij je NKO-arts, huisarts of kinderarts voor een controleonderzoek.



## Ons team

### Dienst NKO

Secretariaat NKO 09 364 84 62  
Route 61

Dr. Y. Callier 09 364 84 10  
Dr. K. David 09 364 84 63  
Dr. R.-A. Desterbeck 09 364 84 12

### Verpleegafdeling Pediatrie

09 364 87 70  
Route 109

### Afdeling Spoedgevallendienst

09 364 85 55  
Route 112

#### AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw

📍 Godveerdegemstraat 69  
9620 Zottegem  
☎ T 0032 9 364 81 11  
F 0032 9 364 89 00  
✉ info@sezz.be  
🌐 [www.sezz.be](http://www.sezz.be)

0418.558.166  
RPR Gent, afd. Oudenaarde

#### Medisch Centrum Brakel

📍 Watermolenstraat 74-76  
9660 Brakel  
☎ T 0032 55 42 66 01

doc482/2022/v3

Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn de medewerkers en artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk.

Qualicor EUROPE

Lid van  E17  
ziekenhuis  
netwerk

## PEDIATRIE

# POSTOPERATIEVE ZORGEN BIJ KINDEREN

na het plaatsen van buisjes

# Inleiding

Beste ouder(s),

Je kind werd vandaag in ons ziekenhuis opgenomen voor een ingreep bij 1 van onze NKO- artsen.

Deze folder is specifiek samengesteld om de postoperatieve zorgen, die bij je kind noodzakelijk zijn na het plaatsen van buisjes, zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Je vindt richtlijnen om de zorgen die na de ingreep in het ziekenhuis reeds gestart zijn, thuis zo goed mogelijk verder te kunnen zetten. Op deze manier kunnen we samen werken aan een goed herstel van je zoon of dochter.

Wanneer je na het doornemen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet om de behandelend arts of de afdeling Pediatrie te contacteren.

# Welke verzorging heeft je kind nodig?

## HERSTEL

Na het plaatsen van buisjes worden er geen grote problemen verwacht.

In het ziekenhuis heeft je kind reeds wat gedronken en gegeten. Bij thuiskomst is het aangewezen aanvankelijk met mate lichte voeding te geven om misselijkheid na de narcose te vermijden. Bij aanhoudend braken moet je een arts verwittigen.

Tenzij anders afgesproken, zijn er geen specifieke nazorgen voor de oortjes vereist.

## PIJN

De ingreep is niet pijnlijk dus waarschijnlijk zal je kind niet klagen over oorpijn. Wanneer het kind de dag van de ingreep wat koortsig of lastig is, kan je Paracetamol<sup>®</sup> of Ibuprofen<sup>®</sup> geven onder de vorm van siroop of zetpil. We verwachten nadien geen problemen meer.

# Wat is belangrijk voor mama en papa?

## SLIJMERIG VOCHT

Het is mogelijk dat er wat slijmerig vocht uit de oortjes loopt gedurende 2 à 3 dagen na de ingreep. Indien langduriger neem je best contact op met de behandelend arts. Wat bloedbijmenging hoeft niet verontrustend te zijn.

## GEEN WATER IN DE OREN

Na het plaatsen van buisjes mag er geen water in de oren komen, bijvoorbeeld tijdens het wassen, in het zwembad. Je schaft hiervoor best oordopjes aan voor je kind.

## TIJDSDUUR AANWEZIGHEID BUISJES

De geplaatste buisjes blijven meerdere maanden in het trommelvlies zitten. Het is zelfs meestal de bedoeling dat ze 1 tot 2 jaar ter plaatse blijven. De buisjes zullen meestal spontaan loskomen uit het trommelvlies. Het gaatje dat na het verlaten van de drain in het trommelvlies aanwezig is, zal na enige tijd vanzelf sluiten.