




PICK-katheter

Inhoud

Wat is een PICK-katheter?	3
Waarom een PICK-katheter?	4
Hoe wordt een PICK-katheter geplaatst?	4
Waar moet ik op letten met een PICK-katheter?	5
Hoe gebeurt de verzorging van de PICK-katheter?	5
Wanneer moet je contact met ons opnemen?	6
Verwijderen van de PICK-katheter	7
Nuttige contacten	7

Wat is een PICK-katheter?

PICK is de afkorting voor **perifeer ingebrachte centrale katheter**. Het is een dun slangetje (katheter) dat via een bloedvat in je bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de katheter komt uit in een groot bloedvat, vlak boven je hart. Er kunnen geneesmiddelen of voedingsoplossingen door de katheter worden toegediend voor een aandoening waarvoor langdurende behandeling is vereist. De PICK-katheter blijft ongeveer 6 weken tot 3 maanden ter plaatse.



Waarom een PICK-katheter?

De behandeling van je aandoening vereist een langdurige toediening van medicatie via de bloedbaan. Door telkens opnieuw in de bloedvaten van je hand of arm te prikken, kunnen ze beschadigd geraken. Zo wordt het steeds moeilijker en pijnlijker om een nieuw perifere infuus te plaatsen. Bovendien kan de frequente toediening van irriterende medicatie zoals chemotherapie, antibiotica of parenterale voeding de aderswand beschadigen.

Een PICK-katheter kan deze problemen voorkomen omdat deze uitmondt in een groot bloedvat. Irriterende vloeistoffen worden onmiddellijk sterk verdund door de grote hoeveelheid bloed die stroomt door de grote ader waarin de kathetertip zich bevindt.

Hoe wordt een PICK-katheter geplaatst?

Het is zeer belangrijk dat de PICK-katheter steriel geplaatst wordt om infecties te voorkomen. Het inbrengen van een PICK-lijn gaat daarom door in het operatiekwartier, dit duurt ongeveer een halfuur. Hiervoor wordt de arm afgedekt met steriele doeken en ontsmet tot aan de oksel. De insteekplaats van de katheter wordt lokaal verdoofd. De katheter wordt ingebracht via een ader in de arm en verder doorgeschoven tot boven het hart. Daar voel je zelf weinig tot niets van.

Waar moet ik op letten met een PICK-katheter?

- Er mag uit de arm waarin de PICK-lijn is ingebracht, alleen via deze lijn bloed afgenomen worden. Bloedafname via een prik in de ader is niet toegestaan omdat de lijn mogelijk aangeprikt wordt en beschadigd raakt.
- Er mag geen bloeddruk gemeten worden aan de arm waarin de PICK-lijn is ingebracht. Je kan de lijn hierdoor beschadigen of verstopen.
- Je kan met de PICK-lijn douchen, als je ervoor zorgt dat de insteekopening droog blijft. Je kan hiervoor bijvoorbeeld huishoudfolie rond je arm wikkelen. Houd de arm ook zoveel mogelijk uit de rechtstreekse douchestraal. Vervang daarna eventueel de doorzichtige pleister (Tegaderm®/OPSITE®). Wij raden je af om te baden en zwemmen.
- Laat je niet onder je oksels omhoog tillen. Daardoor kan de PICK-lijn verschuiven.
- Je mag de arm waarin de PICK-lijn is geplaatst verder normaal gebruiken. Sporten mag maar gebruik de arm echter niet als je iets zwaars tilt en bij opdrukken.
- De **hersenactiviteit** wordt gemeten met elektroden op je hoofd (EEG of elektro-encefalogram).

Hoe gebeurt de verzorging van de PICK-katheter?

Zolang je in het ziekenhuis verblijft, verzorgt de verpleegkundige de PICK-lijn. Thuis wordt de zorg door de thuisverpleegkundigen opgenomen. De behoeften voor de wekelijkse verzorging worden voorzien door de ziekenhuisapotheek.

INSTRUCTIES VOOR DE THUISVERPLEEGKUNDIGE:

- De insteekplaats en het uitwendige gedeelte van de PICK-katheter moeten met een transparant beschermend verband worden afgedekt (Tegaderm® of OPSITE® IV 3000 10*12 cm). Dit verband moet wekelijks worden vervangen en eerder indien het bevuild, los of vochtig is geworden.
- De insteekplaats moet wekelijks worden ontsmet met chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% (Pharmawhite Chlohex 0.5 alco coloured 250ml). Om de PICK-katheter op zijn plaats te houden wordt een speciale pleister gebruikt, de Statlock®. Deze moet wekelijks worden gewisseld, of sneller als het materiaal niet meer kleeft of bevuild is.
- VOOR en NA elk gebruik of manipulatie moet de PICK-katheter gespoeld worden met een steriele zoutoplossing (NaCl 0,9 %). Na toediening van medicatie: 10 ml. Na bloedafname of voedingsinfuus: 20 ml. Indien de PICK-katheter niet in gebruik is moet deze wekelijks gespoeld worden met 10 ml via de start-stop methode. Spuit 10ml pulserend in: 2ml inspuiten, stop; terug 2ml inspuiten, stop; enz.; spuit de laatste 2 ml langzaam maar vloeiend in waarbij tegelijk de klem wordt toegezet zodat er positieve druk wordt gecreëerd. Verwijder vervolgens de spuit terwijl druk op de stamper blijft behouden.
- De Bioconnector moet minimaal wekelijks vervangen worden.

Wanneer moet je contact met ons opnemen?

Een enkele keer kan een PICK-katheter en/of het inbrengen ervan complicaties geven. Neem direct contact op met je behandelende arts in de volgende gevallen:

- Bij beschadiging van de PICK-katheter (gaatje of barst): sluit de lijn boven de beschadiging met een klemmetje en neem contact op met het ziekenhuis.
- Bij koorts (temperatuur boven de 38,5°C) en/of koude rillingen.
- Als de insteekopening rood ziet en/of pijnlijk/drukgevoelig is.
- Als er bij de insteekopening vocht of etter vrijkomt.
- Bij kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas.

- Als er geen vloeistof meer door de PICK-katheter wil.
- Als de katheter naar buiten lijkt te schuiven. Probeer in dat geval de katheter niet terug te schuiven, maar maak deze lijn vast met een extra pleister op de arm.
- Bij pijn in de nek, arm of tussen de schouderbladen tijdens het toedienen van vloeistoffen via de katheter.

Verwijderen van de PICK-katheter

Je behandelende arts zal bepalen wanneer de PICK-katheter mag verwijderd worden. Dit gebeurt door de katheter uit te trekken en even na te drukken ter hoogte van de insteekplaats. Het verwijderen mag door een arts of een verpleegkundige gebeuren.

Nuttige contacten

Vragen rond medisch materialen en antibiotica?

Contacteer de Apotheek: 09 364 85 00

Technische problemen met je katheter?

Contacteer je thuisverpleegkundige of verpleegkundige van het woonzorgcentrum

Medische vragen?

Contacteer de behandelende arts

Dringende medische of logistieke vragen buiten de openingsuren?

Contacteer de Spoedgevallendienst: 09 364 80 05

NOTITIES

AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM VZW

Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem
T 09 364 8111 | info@sezz.be | www.sezz.be
0418.558.166 | RPR Gent, afd. Oudenaarde

MEDISCH CENTRUM BRAKEL

Watermolenstraat 74-76, 9660 Brakel
T 055 42 66 01

Deze informatiebrochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet.

Mocht deze informatiebrochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn de medewerkers en artsen hiervoor niet aansprakelijk.